ООО «Базовая дезинфекция»
105264, Москва, 9-я Парковая ул., 39
оф.415;
Тел./факс: (495) 507 79 84
E-mail: info@badez.ru
www.badez.ru

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Базовая дезинфекция»
Зотов Д.Н.

ИНСТРУКЦИЯ
НА ГОТОВОЕ СРЕДСТВО КИСЛОТНОЕ ДЛЯ САНУЗЛОВ
АЛМАКЛИН КО1

Кислотное готовое средство против ржавчины и налета — мощное средство, эффективно удаляющее ржавчину, растворяющее мочевой камень и ликвидирующее известковый налет, исключая абразивные повреждения. Предотвращает последующее образование новых отложений солей и ржавчины на обработанной поверхности. Подходит для любых кислотостойких поверхностей.
Соответствует требованиям ГОСТ 32478-2013.

Применяется на всех объектах и учреждениях народного хозяйства, в т.ч. ЛПО и МО, учреждениях социального обеспечения, культуры, спорта, гостиничных комплексах, МО, ГО, МЧС, на предприятиях общественного питания и торговли, включая рестораны, бары, кафе, столовые, фудкорты, продовольственные и промышленные магазины, рынки; на пищеблоках всех организаций и учреждений; на предприятиях пищевой промышленности; для применения в быту.

Состав: очищенная вода, смесь органических кислот, в т. ч. щавелевая кислота, неионогенные ПАВ, отдушка.
Плотность: 1,0-1,2 г/см^3 (при t 20°С)
Показатель pH 1% раствора: 1,0-2,5

Способ применения:
Нанести средство на поверхность, после чего оставить на 5-10 минут. Для достижения максимального эффекта следует почистить поверхность ёршиком или щёткой и тщательно смыть водой. При сильном загрязнении обработку повторить.

Условия хранения:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°С. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя: 2 года.

Меры предосторожности:
Не давать в руки детям.
При попадании в глаза и другие слизистые оболочки промыть водой и обратиться к врачу.
При попадании на кожу концентрированного средства – смыть водой.
При работе с концентрированным средством во время обработки рекомендуется использовать перчатки.
При проглатывании средства обратиться к врачу.

Упаковка: флаконы 0,5л с распылителем, 1л, канистры 5л, 10 л.