ООО «Базовая дезинфекция»
105264, Москва, 9-я Парковая ул., 39
оф.415;
Тел./факс: (495) 507 79 84
E-mail: info@badez.ru
www.badez.ru

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Базовая дезинфекция»
_____ Зотов Д.Н.

ИНСТРУКЦИЯ

НА ГОТОВОЕ ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРА И НАГАРА

АЛМАКЛИН S03

Готовое к применению щелочное средство для удаления жира и нагара. Не оказывает отрицательного воздействия на материалы. Не токсично, биологически разлагаемо. Обладает высокими обезжиривающими и моющими свойствами. Эффективно удаляет подгоревший жир, масло, стойкие пищевые загрязнения.
Соответствует требованиям ГОСТ 32478-2013.

Предназначено для мойки и обезжиривания поверхностей стеклокерамических плит, духовок, гриля, и др. кухонного оборудования, вытяжек из различных материалов: нержавеющей стали, кафеля, пластика на всех объектах и учреждениях народного хозяйства, в т.ч. ЛПО и МО, учреждениях социального обеспечения, культуры, спорта, гостиничных комплексах, МО, ГО, МЧС, на предприятиях общественного питания и торговли, включая рестораны, бары, кафе, столовые, фудкорты, продовольственные и промышленные магазины, рынки; на пищеблоках всех организаций и учреждений; на предприятиях пищевой промышленности; для применения в быту.

Состав: очищенная вода, гидроксид натрия, гидроксид калия, неионогенные ПАВ.

Плотность: 1,0-1,3 г/см^3 (при t 20°С)

Показатель pH 1% раствора: 11,0-12,5

Способ применения:

Нанести средство на поверхность при помощи распылителя или губки. При необходимости растереть губкой. Оставить на поверхности на 10-15 минут. Смыть большим количеством воды.

Условия хранения:

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°С. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя: 2 года.

Меры предосторожности:

Не давать в руки детям.
При попадании в глаза и другие слизистые оболочки промыть водой и обратиться к врачу.
При попадании на кожу концентрированного средства – смыть водой.
При работе с концентрированным средством во время биоцидной обработки рекомендуется использовать перчатки.
При проглатывании средства обратиться к врачу.

Упаковка: флаконы 0,5 л с распылителем, канистры 5л.